Simpósio IPNI Brasil

BOAS PRÁTICAS PARA USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES EM CAFÉ

Poços de Caldas - MG • 27 e 28 DE SETEMBRO/2016

NOVAS FONTES DE FERTILIZANTES

*Heitor Cantarella
Centro de Solos e Recursos Ambientais
Instituto Agrônômico, Campinas (IAC)*

Temas

2

- **Eficiência de uso de nutrientes**
 - ▣ **Principais causas de perdas**
- **Fertilizantes de liberação lenta**
- **Fertilizantes de liberação controlada**
- **Fertilizantes contendo aditivos**
- **Comentários finais**

3

Eficiência de Uso de Fertilizantes

Eficiência média de uso de nutrientes

4

- **N: 40 – 60%**
- **P: 10 – 30%**
- **K: 50 – 70%**
 - **O que significam esses números?**
 - **Qual o horizonte de tempo?**
 - **Curto prazo: \$\$\$**
 - **Baixa eficiência em longo prazo: perda ou imobilização permanente**

Estimativas de consumo e exportação de nutrientes pela colheita por culturas no Brasil no período 2009-2012

5

Cultura	Consumo de nutrientes			Exportação pela colheita		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
	----- Mt -----			----- % -----		
Milho	3,35	2,13	2,10	79	96	65
Cana	2,88	1,00	3,13	80	70	67
Arroz	0,58	0,33	0,28	103	74	91
Laranja	0,28	0,11	0,21	51	28	67
Café	1,44	0,40	1,01	20	11	45

Fonte: Cunha et al., 2014 (IPNI)
**BALANÇO DE NUTRIENTES NA AGRICULTURA
 BRASILEIRA – 2009 A 2012**

José Francisco da Cunha¹
 Eros Artur Bohac Francisco²

Valter Casarin³
 Luís Ignácio Prochnow⁴

Eficiência de uso de fosfatos

6

- **Depende da solubilidade (& modo de aplicação)**
 - **Fosfatos naturais: dependem da reação com o solo para disponibilizar o P para as plantas**
 - **Fosfatos solúveis:**
 - **Reação com o solo (fixação) é principal risco**

Reações de P com Ca, Fe ou Al determinam, em grande parte, a biodisponibilidade de P

Fertilizantes potássicos

7

- **Principais fatores que afetam eficiência:**
 - **Efeito salino (KCl)**
 - **Lixiviação**
 - **Aplicações localizadas e com altas doses**
 - **Solos arenosos**

Perdas de N no solo

8

- **Lixiviação**
- **Desnitrificação**
- **Volatilização de amônia (NH_3)**

Lixiviação de nitrato

- ❖ Nitrificação é relativamente rápida (dias/semanas) em solos com umidade e pH corrigido
- ❖ Nitrato (NO_3^-) não é retido no solo (predominância de cargas negativas na superfície)
- ❖ Perda por lixiviação de nitrato pode ser importante se dose de N for alta e não houver plantas para absorvê-lo
- ❖ Nitrato é movimentado no solo com a água da chuva ou irrigação

Nitrosomonas

Nitrobacter

Volatilização de amônia (ureia)

11

Condições:

- umidade
- presença da enzima
- independe do pH do solo
- resíduos de plantas aumentam perdas
- risco de perdas altas (até 40-60% do N aplicado)

BPM: boas práticas de manejo de fertilizantes

12

Teoria do 4-C

Fertilizante certo

Dose certa

Local certo

Época certa

Debate promovido pelo IPNI

13

Fertilizantes de Eficiência Aumentada

Fertilizantes de Liberação Lenta

Alternativas aos Fertilizantes Convencionais

14

□ “Fertilizantes de Eficiência Aumentada*”

- **A) Fertilizantes de liberação lenta/controlada**
 - Recobertos, encapsulados, insolúveis etc.
- **B) Fertilizantes estabilizados**
 - Contêm aditivos ou inibidores

*Enhanced efficiency fertilizers (EEF)

Fertilizantes de eficiência aumentada*

15

- **Fornecer nutrientes acompanhando a necessidade da planta**
- **Reduzir necessidade de parcelamento**
- **Diminuir perdas**
 - **Produtos de baixa solubilidade**
 - **Liberação lenta**
 - **Inibidores**

Fertilizantes nitrogenados de liberação lenta

16

- **Ureaformaldeído (UF): 38%N**
- **Isobutilidene diureia (IBDU) 31%N**
- **Crotonilidene diureia (CDU): 32%N**
 - **Entre outros**

- *Não são novos: conhecidos há muito tempo*
- *Participação decrescente no mercado de FEA*
- *Café: Versões de ureaform no mercado, especialmente para café em formação*

17

Fertilizantes de Liberação Controlada

Fertilizantes encapsulados ou recobertos (polímeros ou resinas)

18

Mecanismo de funcionamento

1. Água penetra no grânulo pelos poros do polímero
2. Dissolve nutrientes = aumenta pressão osmótica
3. Solução sai por difusão

Fertilizantes nitrogenados de liberação controlada – Coberturas com polímeros

19

Liberação é controlada pela composição ou espessura do recobrimento:
Ex. 80% liberado em 30 dias, 90 dias etc

Vários produtos, com diferentes tecnologias de produção da cobertura

**Osmocote; Meister
Nutricote; Poly-S**

Liberação controlada de nutrientes em fertilizantes recobertos com polímeros

20

Temperatura média do solo	3 M	6 M	9 M	12 M
	Tempo médio para liberação (meses)			
15 °C	4 a 5	6 a 7	9 a 10	13 a 14
21 °C	3 a 4	5 a 6	8 a 9	11 a 12
27 °C	2 a 3	4 a 5	7 a 8	10 a 11

Prazo para liberação dos nutrientes controlado pelas características do material de cobertura e pela temperatura do solo

21

ALGUNS RESULTADOS COM FEA

Câmaras de volatilização

22

Controle de pressão e vasão

Perdas cumulativas de NH₃

23

Tukey, P ≤ 5%

Volatilização acumulada

24

Fertilizante	Volatilização de NH ₃	
	Até 16 dias (antes da quebra dos fertilizantes)	Total
----- % do N aplicado -----		
UR	26 b	26 b
SuperN (NBPT)	6 a	6 a
Producote 39	5 a	9 a
Producote 37	0,4 a	12 a
CV(%)	28	28

Tukey, P ≤ 5%

Ureia x ureia liberação controlada em café: 2008

25

Sem diferença entre ureia liberação controlada e ureia parcelada em 3 vezes

Fonte: Cantarella & Gallo (2010)

Ureia x ureia liberação controlada em café: 2009

26

Sem diferença entre ureia liberação controlada e ureia parcelada em 3 vezes

Efeito residual; alta produtividade e variabilidade

Fonte: Cantarella & Gallo (2010)

Café irrigado do cerrado: Liberação lenta (x1) vs solúveis (4 parcel).

27

Tratamentos	Produção de café beneficiado nos anos				
	2010	2011	2012	2013	Soma
	----- kg/ha -----				
Testemunha	1554 a	684 b	636 b	420 c	3294 b
Solúvel ⁽¹⁾ , parcel (4)	1674 a	1098 b	3240 ab	1740 ab	7752 ab
LL ⁽²⁾ 100	1920 a	1554 ab	3846 a	1782 ab	9102 a
LL (-20%)	1428 a	3258 a	3888 a	1812 ab	10386 a
LL (-40%)	1506 a	2112 ab	4380 a	2076 a	10074 a
LL (-60%)	1704 a	690 b	2778 ab	1380 b	6552 ab
CV	33	26	33	19	33

Dose de N e K₂O⁽³⁾	393, 270	501, 396	501, 396	501, 396	501, 396
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

LL: Agrocote F31-00-00+13S e F00-00-51+14S) aplicados em outubro; Solúveis: ureia, SA, KCl, aplicados de outubro a março.

Sem diferença entre fontes na maioria dos casos

Fertilizantes de Eficiência Aumentada - Conclusão

28

- **É possível aumentar a eficiência de uso**
 - ▣ **Especialmente quando há redução de perdas**
- **FLL ou FLC permitem redução de parcelamentos**

Fertilizantes de liberação lenta ou controlada:

29

- **Muitos resultados positivos na literatura**
 - **Aumento da EUN**
 - **Dispensa parcelamentos**
- **Às vezes a liberação do nutriente não é a pretendida: resultados desfavoráveis ou iguais às fontes solúveis**
 - **Falhas no recobrimento**
 - **Condições solo/clima não favorecem liberação/dissolução: liberação do N antes ou depois do pretendido**

Relação de preços de fertilizantes LL/C pode ser limitante

30

SCU – PCSCU	2:1
UF	3 a 5:1
Polímeros	4 a 8:1

Custo do polímero: 10 a 30 vezes o custo do fertilizante

Indústrias no Japão, Israel e EUA trabalham para reduzir custo de fertilizantes LL/C

Mercado pequeno mas em grande crescimento

Fertilizantes Contendo Aditivos

Fertilizantes Estabilizados

32

Fertilizantes convencionais contendo aditivos para reduzir perdas

- Inibidores de nitrificação
- Inibidores de urease

- Há também aditivos com o propósito de reduzir fixação de P
 - Eficiência precisa ser testada

Inibidores de Nitrificação: *reduzir perdas por lixiviação de nitrato*

33

Muitos compostos testados

- Nitrapirina (2-cloro-6-(triclorometil) piridina)
 - Para fluidos
 - Relativo sucesso no mercado americano
- Dicianodiamida (DCD)
 - Bom efeito mas doses são relativamente altas
 - É também fertilizante de liberação lenta (65% N)
- DMPP (fosfato de 3,4-dimetil pirazole)
 - Mistura com fertilizantes sólidos
 - Bom potencial.

Inibidor de nitrificação (DMPP): 86 experimentos

34

Na maioria dos ensaios a produção com o inibidor foi mais elevada:

Ganhos (t ha⁻¹):

Trigo: + 0,25

Milho: + 0,24

Batata: + 1,6

Beterraba: + 0,24

Arroz: +0,29

Inibidores de nitrificação: resumo

35

- ❑ **Efeitos positivos em apenas parte dos experimentos**
- ❑ **Potencial em solos leves e com riscos de lixiviação**
- ❑ **Nem sempre são substitutos para bom manejo mas, oferecem flexibilidade para alternativas de manejo (antecipação de aplicação, redução de parcelamentos)**
- ❑ **Em café?????**

Inibidores de urease

36

- Finalidade: reduzir perdas de N por volatilização de NH_3 com o uso de ureia
- Literatura: > 14.000 compostos ou misturas testadas como inibidor de urease de solos (Kiss & Simihaian, 2002)
- Produtos comerciais à base de NBPT
 - Outras formulações devem entrar no mercado em breve

Fundamento para ação dos inibidores de urease

37

- Retardar hidrólise de ureia e reduzir perdas de NH_3
- Estabilidade: 3 a 15 dias (T, umidade):
 - Brasil: 3 a 7 dias
- NBPT reduz e atrasa o pico de hidrólise em relação ao da ureia sem inibidor.
- Em temperaturas mais baixas o efeito do NBPT é mais duradouro.

Inibidores de urease: resultado típico

38

Perdas de NH₃ em campo. Brasil

39

Cultura/Local	Volatilização de NH ₃ (Percentagem de redução comparado à uréia)	
	UR	UR-NBPT
	----- % do N aplicado -----	
Milho Mococa	45	24 (47)
Milho Rib. Preto	37	5 (85)
Milho Mococa	64	22 (65)
Milho e Pindorama	48	34 (29)
Pastagem 1	18	6 (69)
Pastagem 2	51	22 (56)
Pastagem 3	18	3 (83)
Pastagem 4	18	2 (89)
<i>Média</i>	<i>37</i>	<i>15 (60)</i>

Resposta de milho a N-ureia (com ou sem NBPT). Brasil

40

Fonte de N	Média de 7 locais responsivos a N	
	Rendimento	Acréscimo
	----- kg/ha de grãos -----	
UR	7045	-
UR+NBPT	7405	351
NA	7526	471

Resultados são médias de 3 doses de N

NBPT é menos efetivo para controlar perdas de NH₃ em solos ácidos

41

Tratamentos	Perda acumulada de NH ₃ em solo com pH ajustado					
	pH 4,5		pH 5,4		pH 6,1	
	————— % do N aplicado —————					
UR	26	Ab	26	Ab	32	Aa
UR + NBPT	21	Ba	18	Bb	19	Bab
Redução (%)	19		31		41	

Médias com a mesma letra maiúscula na vertical e minúscula na horizontal não diferem entre si pelo teste Tukey, $p \leq 0,10$.

NBPT:

42

- ❑ **O NBPT não elimina mas reduz as perdas de NH_3 permitindo o aumento da eficiência de uso da ureia**
- ❑ **Eficiência depende de condições ambientais**
- ❑ **Quanto maior o risco de perdas de NH_3 , maior pode ser o benefício do uso do inibidor**

- **FEAs ganham espaço**
 - **Produtos com inibidores já tem fatia considerável de alguns mercados**
 - **Liberação lenta/controlada: aos poucos deixam de ser produtos de nicho**
 - **\$\$**
 - **Há produtos no mercado (recobertos com polímeros) que não realizam o que a propaganda diz.**
 - **Redução de doses para justificar produtos mais caros**
 - **Nem sempre o benefício paga o custo adicional**

Quando é viável reduzir doses com FEA?

44

- Quando o aumento da eficiência implica em redução de perda para o ambiente
 - Volatilização de NH_3 ; lixiviação (N, K, etc)
 - Para alguns casos, o parcelamento é uma opção para reduzir perdas.
- É difícil dimensionar perdas a priori. Geralmente estão associadas a fatores climáticos

Quando é arriscado reduzir doses com FEA?

45

- **Quando os ganhos com a redução das doses não são, pelo menos parcialmente, apropriados pelo agricultor**
 - **Redução de doses pode implicar em redução do estoque de nutriente no solo (diminuição da fertilidade a médio prazo)**
 - **As doses recomendadas em muitas situações estão próximas da exportação.**
 - **P tem longo efeito residual. O K também é retido no solo (exceto em solos muito arenosos). O N se acumula na fração orgânica e é responsável pelo suprimento das plantas em longo prazo.**

Como pagar pela tecnologia dos FEA?

46

- **Considerar o custo extra como seguro contra perdas**
 - ▣ **Preço não pode ser muito diferente de opções de manejo/outras fontes**
- **Compensar com conveniências ou reduções de outros custos**
 - ▣ **Facilidade de operação**
 - ▣ **Economia com equipamentos, mão de obra e tempo**

47

Obrigado

Heitor Cantarella

cantarella@iac.sp.gov.br

Visite-nos em <http://www.nutrientesparaavida.org.br/>

Você sabe o que são nutrientes?

Nutriente é qualquer elemento ou composto químico necessário para o funcionamento de um organismo vivo e compõe os alimentos. Nutrientes são essenciais para a vida!

Saiba mais sobre o NPK

N 7 30.973762 NITROGÊNIO	P 15 39.0983 FÓSFORO	K 39.0983 POTÁSSIO
--	--------------------------------------	---------------------------------

O que é NPK?

5 Fatos sobre Fertilizantes

5 fatos sobre fertilizantes

Nutrindo as plantas para nutrir as pessoas.

Vídeos

A importância do solo como recur...